

Guía de requisitos de inmunización en Oklahoma: Año escolar 2023-24



Todos los niños/as de dos meses de edad y mayores deben presentar un registro de inmunización o solicitar para una exención antes de que se les permita asistir al cuidado infantil o la escuela en Oklahoma. Lea las viñetas a continuación para obtener información esencial.

Edad/Grado	Inmunizaciones requeridas con dosis acumulativas requeridas	Inmunizaciones recomendadas	
Cuidado infantil <i>Actualizado para la edad</i>	4 DTaP* (difteria, tétanos, tos ferina) 1-4 PCV* (neumococo) ◆ 1-4 Hib* (<i>Haemophilus influenzae</i> tipo B) ◆ 1 MMR* (sarampión, paperas, rubéola) 1 Varicela	3 IPV* (polio) 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B)	Gripe estacional (gripe)
Preescolar/Pre-K	4 DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) 1 MMR (sarampión, paperas, rubéola) 1 Varicela	3 IPV (polio) 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B)	Gripe estacional (gripe) 2 ^{da} varicela a los 4 años Polio en o después del 4 cumpleaños
Kínder-6^o	5 DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) ★ 2 MMR (sarampión, paperas, rubéola) 1 Varicela	4 IPV (polio) ◀ 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B)	Gripe estacional (gripe) 2 ^{da} varicela a los 4 años Polio en o después del 4 cumpleaños
7^{mo} -12^o	1 Tdap* (tétanos, difteria, tos ferina) ● 5 DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) ★ 2 MMR (sarampión, paperas, rubéola) 1 Varicela	4 IPV (polio) ◀ 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B) ■	Gripe estacional (gripe) 2-3 HPV* (virus del papiloma humano) 1-2 MCV4* (meningocócica ACWY) 2-3 Men B*(meningocócica serotipo B)

El calendario actual de inmunización infantil se puede encontrar en <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>.

- Las dosis administradas 4 días o menos antes de los intervalos mínimos o edades se cuentan como dosis válidas. Esto no se aplica al intervalo mínimo de 28 días entre las dosis de vacunas vivas no administradas el mismo día.
- Si un padre o una madre informa que su hijo/a tenía la enfermedad de varicela, no se requiere que el niño/a reciba la vacuna contra la varicela. Registre el historial de varicela del niño/a.
- Las primeras dosis de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola (MMR), la varicela y la hepatitis A deben administrarse en o después del primer cumpleaños del niño/a (o dentro de los 4 días antes del cumpleaños), o no contarán para el requisito de inmunización y debe ser repetido.
- No es necesario reiniciar la serie de ninguna vacuna si una dosis se administró tarde o si una dosis está vencida. Las dosis adicionales de una serie de vacunas que se administran después de la fecha de vencimiento no afectan la inmunidad final.
- Se puede permitir que los niños/as asistan al cuidado infantil y la escuela si han recibido a menos una dosis de todas las vacunas requeridas debido a su edad o grado, y las siguientes dosis aún no se deben. Deben completar las dosis restantes de vacuna a tiempo. Estos niños/as están en el proceso de recibir inmunizaciones.
- Las vacunas contra Hib y PCV no se quieren para estudiantes en programas de preescolar, pre-kínder o el kínder operados por escuelas, a menos que el centro sea un centro de cuidado infantil con licencia. Se requieren vacunas contra Hib y PCV para los niños/as que asisten a centros de cuidado infantil con licencia.
 - ★ Si la 4^a dosis de DTaP se administra en o después del 4^o cumpleaños del niño/a, entonces no se requiere la 5^a dosis de DTaP.
 - ◆ El número de dosis de PCV y/o Hib puede variar de 1 a 4 dependiendo de la edad del niño/a, cuando se administró la primera dosis y el tipo de vacuna utilizada.
 - ◀ Si la 3^a dosis de IPV se administra en o después del 4^o cumpleaños del niño/a, y al menos seis meses después de la dosis anterior, entonces no se requiere la 4^a dosis de IPV.
 - Los estudiantes de 11 a 15 años de edad que no hayan recibido la vacuna contra la hepatitis B pueden recibir una serie de 2 dosis de la vacuna Merck® contra la hepatitis B para adultos para cumplir con este requisito. Todos los demás niños/as (menores o mayores) deben recibir 3 dosis de la vacuna pediátrica contra la hepatitis B.
 - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan una dosis de Tdap en o después del 10^o cumpleaños, incluso si se recibió previamente. Se puede aceptar una dosis inadvertida de DTaP en o después del 10^o cumpleaños para el requisito de Tdap de 7^o grado.

Para obtener más información, llame al Servicio de inmunización al (405) 271-4073 o visite nuestro sitio web en: <https://oklahoma.gov/health/immunizations>.

Revisado 06/02/2023 IMM 400

* -por sus siglas en inglés