

# Piridoxina: Guía para el paciente sobre como tomar medicamentos para la tuberculosis

## ¿Qué es la piridoxina?

Piridoxina es otro nombre para la vitamina B6. La vitamina B6 se usa para prevenir el entumecimiento y el hormigueo de las manos o los pies causados a veces por la isoniazida (INH) u otros medicamentos contra la TB.

## ¿Cómo tomo este medicamento?

- Es muy importante tomar el medicamento todos los días o según las indicaciones de su doctor.
- Informe inmediatamente a su doctor si deja de tomar su medicamento
- Si olvida una dosis, tómela lo antes posible, pero nunca tome dos dosis a la vez.
- Trate de tomar el medicamento con el estómago vacío. Si le molesta el estómago, tómelo después de las comidas.
- Guarde en un lugar seco y fresco.
- Proteja contra la luz
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Recuerde informar a su doctor acerca de otros medicamentos que esté tomando o de cualquier medicamento nuevo que comience a tomar

## Consejos para tomar medicamentos contra la tuberculosis:

- Tome su medicamento a la misma hora todos los días, por ejemplo:
  - Antes de ir a la cama
  - A primera hora de la mañana
- Use un envase de pastillas semanales
- Marque cada día en un calendario después de tomar sus píldoras